



Clindamicina por exposición al Antrax Hoja de información

¿Qué es Clindamicina?

Clindamicina (Cleocin) pertenece a una clase de antibióticos llamados quinolonas. Esta clase de droga ha sido aprobada por la Administración de drogas y comidas (FDA) por sus siglas en inglés, para tratar y proteger a las personas que han sido expuestas a las esporas del Antrax. Típicamente es provista en tabletas de 600-mg para tomarse oralmente.

¿Cómo tomo la clindamicina?

Adultos: Tomar 600mg una vez cada 8 horas como se le indica. Trate de tomar la tableta a la misma hora cada día. Tome suficientes líquidos con el medicamento.

Niños : Consulte con su doctor o entidad que se lo recetó.

Dosificación de la Clindamicina durante un evento de ataque de bioterrorismo por antrax: Inicialmente un tratamiento de 10 días será provisto a todos los individuos que pudieron haber sido expuestos al ántrax. Se dará un tratamiento adicional de 50 días a los individuos que hayan sido identificados como directamente expuestos al antrax en un ataque.

¿Qué hago si dejo de tomar una dosis?

Principie tomando 600 mg. cada 8 horas. **No** tome 2 veces la cantidad recetada para reponer la que dejó de tomar. Termine toda la medicina como se le recetó, a menos que su doctor le de otras instrucciones. No terminar toda la medicina puede dar como

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





Clindamicina por exposición al Antrax Hoja de información

resultado enfermedad y aumenta las posibilidades de tener una infección que ya no responda al tratamiento.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la clindamicina?

Erupciones cutáneas (piel), dolor abdominal, náusea, vómitos, diarrea, anormalidades de la función hepática, ictericia, poli-artritis, y dolor de garganta (esofaguitis) han sido observados. Si usted experimenta síntomas severos consúltele a su doctor.

Menciones Especiales: El efecto secundario más severo de este medicamento es reacciones severas en la piel. Si experimenta reacciones en la piel u otros signos de alguna reacción alérgica después de tomar este medicamento consúltele a su doctor.

Diarrea moderada o severa ha sido observada con muchos agentes antibacteriales incluyendo la clindamicina. Tome muchos líquidos y notifique a su doctor si experimenta síntomas más severos.

Precauciones:

- Informe a su médico de **todos** los medicamentos que está tomando actualmente, incluyendo suplementos y medicamentos que se compran sin receta. Agentes bloqueadores neuromusculares y eritromicina son dos medicamentos afectados por Clindamicina.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





Clindamicina por exposición al Antrax Hoja de información

- Informe a su médico si usted tiene historia de problemas con sus tendones, debilidad muscular, o alguna otra condición médica crónica.
- No maneje u opere maquinaria pesada hasta que sepa como su cuerpo reacciona a este medicamento.
- Díglele a su doctor si está embarazada o planea estarlo. Ensayos Clínicos muestran seguridad en el último trimestre pero el primer trimestre no ha sido evaluado. En un evento donde la vida está en peligro como un ataque terrorista, es más seguro que sea requerido.
- Díglele a su doctor si está dando pecho o planea hacerlo.

Para mayor información, contacte al Departamento de Salud de la Ciudad y del Condado de Oklahoma de Oklahoma

(405) 425-4437

Revisado 06/2015

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play



WELLNESS NOW