



Hoja de información sobre la Difteria

¿Qué es la difteria?

Difteria es una enfermedad altamente contagiosa causada por una bacteria. La difteria causa inflamación de la garganta, nariz, amígdalas, y fiebre alta. Puede interferir con tragar y hace que el paciente se sofoque. La infección puede también producir venenos que circulen en la sangre y dañen el corazón, los riñones y el sistema nervioso. Más o menos 1 de cada 10 personas a las que les da difteria muere.

¿A quién le da difteria?

En el pasado, los niños menores de 15 años de edad que no habían sido vacunados fueron los que con mayor seguridad les daba difteria. En años recientes, los adultos no inmunizados son los que están más propensos a enfermarse.

¿Cómo se disemina la difteria?

La difteria se disemina a través del aire que viene de la boca, de la garganta o nariz de una persona infectada tosiendo o estornudando. Raramente, la difteria se disemina por contacto con artículos sucios con fluidos de lesiones de la piel de una persona infectada.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





Hoja de información sobre la Difteria

¿Cuáles son los síntomas de la difteria?

Los síntomas de la difteria varían dependiendo de que parte del cuerpo esta infectado. Las infecciones más comunes ocurren en la garganta y las amígdalas causando síntomas que van desde fiebre leve, escalofríos y dolor de garganta hasta sentirse severamente enfermo por una enfermedad general. Otros síntomas que podrían ocurrir incluyen ronquera, tos, rinorrea (secreción mucosa líquida de la nariz), erupción escamosa y lesiones abiertas de la piel.

¿Por cuánto tiempo puede una persona infectada diseminar la difteria?

Usualmente una persona infectada puede diseminar la difteria por 2 a 4 semanas después de que los síntomas se hallan desarrollado. El portador crónico que es raro (una persona con infección continua) puede ser infeccioso por 6 meses o más. El tratamiento con antibióticos prevendrá que una persona infectada disemine la difteria.

¿Puede una persona tener difteria otra vez?

Si, un ataque de difteria no siempre proporciona protección para toda la vida.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

[OCCHD App](#) - Busque OCCHD en la Apple Store



o [Google Play](#)





Hoja de información sobre la Difteria

¿Cuál es el tratamiento para la difteria?

Antibióticos y antitoxinas son usados para tratar la difteria. El paciente puede también necesitar ayuda para respirar. Frecuentemente el paciente debe de ser aislado.

¿Deberían de ser tratadas las personas que han estado en contacto con una persona con difteria?

Las personas que viven en la misma casa con la persona que tiene difteria y personas que tienen un contacto cercano con un paciente con difteria deben recibir tratamiento. A estas personas se les deben de hacer pruebas para difteria y examinarlas cada día por 7 días por signos de la enfermedad. También, estas personas deben recibir antibióticos y algunos podrían necesitar ser inmunizados con la vacuna contra la difteria.

¿Cómo podría detenerse la diseminación de la difteria?

La mejor forma de detener la difteria es vacunando a los niños con series de 4 dosis de vacuna DTaP (difteria, tétanos, pertusis acelular (tos ferina) principiando a los dos meses de edad. Los adultos deben recibir un dosis de refuerzo de Td (tétanos, difteria) cada 10 años.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

[OCCHD App](#) - Busque OCCHD en la Apple Store



o [Google Play](#)





Hoja de información sobre la Difteria

¿Causa reacción la vacuna de la difteria?

Después de que una persona recibe una vacuna contra la difteria podría tener algo de enrojecimiento y dolor en el sitio de la inyección.

¿Dónde puede una persona recibir la vacuna de la difteria?

Niños y adultos pueden recibir la vacuna de la difteria en los departamentos de salud de los condados a través de Oklahoma o con sus médicos privados.

Para más información, comuníquese con el Departamento de salud de la Ciudad y del Condado de Oklahoma al

(405) 425-4437

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play

