



Moxifloxacin (Avelox) Hoja de informaci3n

¿Qu3 es la moxifloxacin?

Moxifloxacin (Avelox) pertenece a la clase de drogas llamadas antibi3ticos quinolonas. Esta clase de drogas ha sido aprobada por la Administraci3n de drogas y comidas (FDA) por sus siglas en ingl3s para tratar y proteger a las personas que han sido expuestas a las esporas del Antrax. Es t3picamente provista en tabletas de 400 mg para ser tomadas oralmente. Se desconoce si la moxifloxacin es segura para ser usada en menores de 18 a3os de edad. Consulte a su doctor para el uso de moxifloxacin en ni3os.

¿C3mo tomo la moxifloxacin?

Adultos: Tome 1 tableta una vez al d3a como se le indica. Trate de tomar la tableta a la misma hora cada d3a. Tome bastantes l3quidos con el medicamento.

Ni3os: Consulte con su doctor o entidad que se lo recet3.

Dosificaci3n de moxifloxacin durante un evento de bioterrorismo de antrax :

Un curso inicial de 10 d3as ser3 provisto a todos los individuos que podr3an haber sido expuestos al antrax. Un curso adicional de 50 d3as ser3 provisto a individuos que hayan sido identificados como directamente expuestos a Antrax en un ataque.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





Moxifloxacin (Avelox) Hoja de informaci3n

Dosis de moxifloxacin durante un evento de bioterrorismo involucrando Plaga:

El medicamento ser1 dado por lo menos en un curso de 10 d1as para aquellos que han sido expuestos a la plaga. Una dosis adicional podr1a ser requerida. Consulte con su doctor o entidad que la recet3

¿Qu3 hago si dejo de tomar una dosis?

Principie tomando las tabletas una vez al d1a. No se pase de 2 tabletas al d1a, a1n si dej3 de tomar una dosis. Termine todas las tabletas, ya sea que se sienta enfermo o no. A menos que un doctor le diga que pare. Parar prematuramente el tratamiento puede resultar en enfermedad, con la posibilidad de resistencia a la droga.

¿Cu1les son los efectos secundarios de la moxifloxacin?

Efectos secundarios menos serios incluyen, n1usea, diarrea moderada, dolor de cabeza, mareo, visi3n, borrosa, nerviosismo, ansiedad, agitaci3n y picaz3n moderada de la piel. **Las reacciones al3rgicas son muy raras.** Si usted desarrolla una erupci3n de la piel, ronchas, se le hincha la lengua, labios, cara u otros s1ntomas serios consulte a su doctor inmediatamente.

Menci3n Especial: Esta medicina puede causar problemas de los tendones y puede empeorar los s1ntomas de miastenia gravis, una condici3n que causa

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





Moxifloxacin (Avelox) Hoja de informaci3n

debilidad muscular. Dígale a su doctor si experimenta dolor de tendones, hinchaz3n o rasgaduras. Tambi3n dígale a su doctor si ha aumentado la debilidad muscular o problemas de respiraci3n mientras est3 tomando moxifloxacin.

Precauciones:

- Inf3rmele a su m3dico de **todos** los medicamentos que est3 tomando actualmente incluyendo suplementos y medicamentos que se compran sin receta. Los medicamentos comunes pueden causar interacci3n con la moxifloxacin.
- Informe a su m3dico si tiene historia de problemas de tendones, debilidad muscular, o cualquier otra condici3n m3dica cr3nica.
- No maneje u opere maquinaria pesada hasta que sepa como su cuerpo reacciona a esta medicina.
- Dígale a su m3dico si est3 embarazada o planea estarlo.
- Dígale a su m3dico si est3 dando pecho o planea hacerlo.

Para mayor informaci3n contacte al Departamento de Salud de la Ciudad y del Condado de Oklahoma al

(405)425-4437

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play

