



## Factores de la Enfermedad Mano, Pie y Boca (Coxsackie virus)

### Que es la enfermedad de mano, pie y boca?

La enfermedad mano, pie y boca es causada por coxsackie virus. Usualmente ocurre durante el período escolar.

### Quién puede contraer la enfermedad?

Cualquiera puede contraer la enfermedad mano, pie y boca.

### Cómo se transmite el virus?

El virus se transmite por las secreciones de la garganta o por heces fecales. La mejor manera de prevenir la enfermedad es cubrir la boca al toser o estornudar con pañuelos desechables, lavarse las manos después de tirar pañuelos sucios y después de cambiar pañales.

### Cuáles son los síntomas de la enfermedad mano, pie y boca?

El mayor síntoma son unas pequeñas úlceras en la boca, manos y pies, parecidas a las de la varicela, poca fiebre y dolor de garganta. Muchos adultos infectados no muestran síntomas.

Que tan pronto aparecen los síntomas después de la infección?

Los síntomas aparecen de 2 a 5 días después de la infección.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





## **Factores de la Enfermedad Mano, Pie y Boca (Coxsackie virus)**

### **Por cuánto tiempo una persona infectada es portadora del Coxsackie virus?**

El Coxsackie virus se ha encontrado en la garganta de personas infectadas hasta por dos semanas (aunque no haya úlceras en la boca) y en las heces fecales hasta un mes después de la infección.

Personas infectadas que no parecen enfermas pueden propagar el virus.

### **Cómo es diagnosticada la enfermedad de mano, pie y boca?**

La mayoría de los casos son diagnosticados solo por los síntomas clínicos.

### **Cuál es el tratamiento para la infección por Coxsackie?**

Usualmente no hay tratamiento.

### **Una persona infectada debe ser excluida de la escuela o el trabajo?**

No.

### **Qué precauciones deben tomar las mujeres embarazadas?**

Deben lavar sus manos cuidadosamente después de manejar pañales sucios o después de tener contacto con orines y saliva. Mujeres embarazadas que trabajan en guarderías no deben besar niños en la boca. Abrazarlos está bien. Mujeres embarazadas deben preguntar a su doctor acerca de Coxsackie virus.

[OCCHD.ORG](http://OCCHD.ORG) |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

[OCCHD App](#) - Busque OCCHD en la Apple Store



o [Google Play](#)





## Factores de la Enfermedad Mano, Pie y Boca (Coxsackie virus)

### Qué se debe hacer para detener la propagación de la enfermedad mano, pie y boca?

Lavarse muy bien las manos es lo mejor para prevenir la infección. Trabajadores de salud deben usar guantes desechables cuando cambien sábanas y ropa sucia con orines o heces fecales de personas enfermas.

*Para mayor información contacte al Departamento de Salud de La Ciudad de Oklahoma*

(405) 425 - 4437

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play

