



## Thông Tin Về Bệnh Do Vi khuẩn Haemophilus Influenzae typ b (Hib)

### Bệnh Haemophilus influenzae typ b là gì?

Haemophilus influenzae loại b (Hib) có thể gây ra nhiễm khuẩn nặng ở trẻ nhỏ. Hơn 100 trường hợp mắc bệnh Hib xảy ra mỗi năm ở bang Oklahoma, hầu hết là viêm màng não (nhiễm trùng các màng của tủy sống và não). Một số người hồi phục từ viêm màng não Hib có các vấn đề mạn tính về não và thần kinh. Hib cũng có thể gây nhiễm trùng máu, viêm phổi, viêm khớp, và nhiễm trùng ở các bộ phận khác của cơ thể. Trong một số trường hợp, bệnh Hib có thể gây tử vong.

### Những ai có thể bị bệnh Hib?

Bệnh Hib phổ biến nhất ở trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi.

### Bệnh Hib lây lan như thế nào?

Bệnh Hib lan truyền qua tiếp xúc với chất nhầy hoặc giọt nước nhỏ từ mũi và họng của người bị bệnh. Nói cách khác, nó lây lan qua không khí sau khi người bệnh ho hay hắt mũi nếu họ không che miệng hoặc mũi.

### Các triệu chứng của bệnh Hib là gì?

Bệnh Hib thường gây sốt, buồn nôn và ói mửa. Người bị bệnh Hib có thể trở nên cáu kỉnh hoặc chậm chạp. Vi khuẩn có thể nhiễm vào các bộ phận khác nhau của cơ thể, do đó các triệu chứng khác có thể xảy ra.

OCCHD.ORG |  Facebook - Tìm kiếm OKC-County Health hoặc là @OCCHD

OCCHD App - Tìm kiếm OCCHD Apple Store



hoặc là Google Play





## Thông Tin Về Bệnh Do Vi khuẩn Haemophilus Influenzae typ b (Hib)

### **Bao lâu sau khi nhiễm thì người bệnh có thể lây truyền Hib?**

Người bệnh có thể lây truyền bệnh Hib khi mà vi khuẩn vẫn còn trong mũi và họng, thậm chí ngay cả sau khi họ cảm thấy khỏe mạnh. Sau 1 đến 2 ngày điều trị với Rifampin, người bị bệnh không thể gây lây truyền bệnh Hib.

### **Người ta có thể bị tái nhiễm Hib không?**

Có. Một lần bị nhiễm trùng không bảo vệ người bệnh khỏi nhiễm Hib.

### **Phương thức điều trị bệnh Hib là gì?**

Thuốc kháng sinh được sử dụng để điều trị nhiễm trùng nghiêm trọng.

### **Có nên điều trị những người đã từng ở xung quanh người bị bệnh Hib?**

Thành viên trong hộ gia đình, những người ở trung tâm giữ trẻ ban ngày, và trẻ em dưới 4 tuổi sinh hoạt chung quanh người bị bệnh có thể cần dùng kháng sinh như Rifampin để tự phòng bệnh hay ngăn gây bệnh những người xung quanh. Những người có tiếp xúc thông thường trong lớp học, văn phòng hoặc nhà máy thường không cần điều trị.

OCCHD.ORG |  Facebook - Tìm kiếm OKC-County Health hoặc là @OCCHD

OCCHD App - Tìm kiếm OCCHD Apple Store



hoặc là Google Play





## Thông Tin Về Bệnh Do Vi khuẩn Haemophilus Influenzae typ b (Hib)

### **Làm thế nào để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh Hib?**

Hiện nay có vài loại vắc-xin ngừa bệnh Hib đang lưu hành. Vắc-xin nên được dùng cho trẻ nhỏ bắt đầu từ 2 tháng tuổi. Đặc biệt quan trọng đối với những trẻ đến trung tâm giữ trẻ ban ngày.

Để biết thêm thông tin về vắc-xin Hib, hãy liên hệ với sở y tế khu vực của bạn.

*Để biết thêm thông tin, xin liên lạc Sở Y Tế Thành phố Oklahoma*

*(405) 425-4437*

Tái bản tháng 04/2013

OCCHD.ORG



Facebook - Tìm kiếm OKC-County Health hoặc là @OCCHD

OCCHD App - Tìm kiếm OCCHD Apple Store



hoặc là Google Play

