



Hoja Informativa de Sarampión

¿Qué es el sarampión?

El sarampión, que no debe confundirse con sarampión alemán (rubéola), es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus. Una fiebre alta y una erupción roja que cubre la mayor parte del cuerpo se desarrolla en casi todos los casos. El sarampión también puede causar neumonía, sordera, inflamación del cerebro y la muerte.

¿Quién contrae el sarampión?

Cualquier persona, independientemente de su edad, que no ha tenido sarampión o no ha sido inmunizado adecuadamente puede contraer la enfermedad. La mayoría de los casos ocurren en niños en edad preescolar no inmunizados y los adultos jóvenes.

¿Cómo se contagia el sarampión?

El sarampión se propaga a través del aire, por gotitas de la nariz, la garganta y la boca de una persona infectada al toser, estornudar, o simplemente hablar.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión causa fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos llorosos, y una erupción roja que va desde de la cara al resto del cuerpo. Los síntomas pueden durar de 1 a 2 semanas.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





Hoja Informativa de Sarampión

¿Por cuánto tiempo puede una persona infectada puede transmitir el sarampión?

Una persona infectada puede contagiar el sarampión a partir de 4 días antes de que comience la erupción y hasta 4 días después de que aparezca la erupción.

¿Puede una persona contraer sarampión de nuevo?

No. Un ataque del sarampión ofrece una protección de por vida.

¿Cuál es el tratamiento para el sarampión?

El reposo en cama es aconsejable cuando el paciente tiene fiebre. Los niños con fiebre muy alta y los niños con dolores de cabeza deben ser tratados con medicamentos contra la fiebre.

¿Las personas que han estado cerca de una persona infectada con el sarampión deben ser tratadas?

Cualquier persona que no ha tenido el sarampión o no ha sido vacunado debe recibir la vacuna del sarampión inmediatamente. Los bebés menores de un año de edad pueden recibir inmunoglobulina (IG) o la vacuna contra el sarampión en función de la edad del niño.

¿Cómo se puede detener la propagación del sarampión?

La mejor manera de detener el sarampión es inmunizar a todos los niños a los 15 meses de edad con la vacuna contra el sarampión (en combinación con las vacunas

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





Hoja Informativa de Sarampión

contra la rubéola y las paperas o MMR). Una segunda dosis de la vacuna contra el sarampión entre los 4 y 6 años de edad o antes del jardín de niños, a partir de ahora se requiere para los niños que ingresan a la escuela en Oklahoma. Los adultos nacidos después de 1956 también pueden necesitar la vacuna contra el sarampión.

¿Causa reacciones la vacuna del sarampión?

Un niño de cada 5 va a desarrollar una erupción o fiebre que comienza una o dos semanas después de la vacunación y dura unos pocos días. En raras ocasiones (1 de cada millón de vacunas) un niño puede tener una reacción más grave a la vacuna triple vírica, tales como la inflamación del cerebro (encefalitis).

¿Dónde pueden los niños recibir la vacuna contra el sarampión?

Niños y adultos pueden recibir la vacuna contra el sarampión en los departamentos de salud del condado en todo Oklahoma o consulte con su médico privado.

Para más información, póngase en contacto con el Departamento de Salud de la Ciudad de Oklahoma

(405) 425-4437

revisado 04/2013

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play

