



Las paperas Hoja Informativa

¿Qué son las paperas?

Las paperas son causadas por un virus y generalmente se describe como una enfermedad leve que causa inflamación de las glándulas en uno o en ambos lados del cuello. Algunas personas que están infectadas no presentan síntomas en absoluto.

Quién se las paperas?

Las paperas se producen generalmente durante la infancia, pero los adultos que no han sido vacunados contra las paperas también pueden infectarse.

¿Cómo se propagan las paperas?

Las paperas se propagan a través de la saliva y las secreciones de la nariz y la boca. En otras palabras, se propaga a través del aire después de que una persona tose o estornuda, en especial, si no se tapa la nariz o la boca.

¿Qué tan pronto aparecen los síntomas?

Los primeros síntomas aparecen después de los 18 días, pero puede desarrollarse en cualquier momento entre los 12 y 25 días después del contacto con una persona infectada.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





Las paperas Hoja Informativa

¿Cuánto tiempo duran los síntomas?

Los síntomas de las paperas tienden a disminuir después de 1 semana y por lo general, desaparecen en un período de 10 días. Si se desarrolla la inflamación en los testículos, por lo general desaparece después de 1 semana, pero la sensibilidad puede durar varias semanas.

¿Por cuánto tiempo puede una persona infectada propagar las paperas?

El máximo período infeccioso se considera entre 2 días antes y 4 días después de la aparición de la enfermedad; el virus ha sido aislado de la saliva 7 días antes y 9 días después de la aparición de la hinchazón, inflamación.

¿Puede una persona contraer paperas más de una vez?

NO. Una infección de paperas protege a una persona por el resto de su vida. Es un mito que dice que si a una persona se inflaman las glándulas de un solo lado puede contraer la enfermedad por el otro lado después. **Las personas infectadas deben ser excusadas de la escuela o el trabajo?**

Sí. Los niños deben ser excluidos de la escuela y los adultos de su lugar de trabajo hasta 9 días después de la hinchazón, inflamación de las glándulas.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





Las paperas Hoja Informativa

¿Existe un tratamiento para las paperas?

No. Sin embargo, los niños (o cualquier adulto que no está protegido) deben recibir protección con la vacuna contra las paperas (generalmente se toma en conjunción con la vacuna contra el sarampión y la rubéola como MMR). La edad recomendada para la vacunación de los niños es de 12 - 15 meses de edad. Algunos adultos nacidos después de 1956 no pueden ser protegidos contra las paperas y deben ser vacunados.

¿La vacuna contra las paperas causan reacciones?

No se han comunicado reacciones adversas en gran escala de ensayos en este campo. En ocasiones, fiebre baja o un sarpullido leve o inflamación puede ocurrir. En muy raras ocasiones, una disfunción del sistema nervioso central puede ocurrir, es un caso de cada millon de dosis.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





Las paperas Hoja Informativa

Cuando una persona puede recibir vacuna contra las paperas?

Los departamentos de salud del condado ofrecen las vacunas de las paperas (MMR) de forma gratuita para los niños de menos de 19 años de edad. Algunos médicos privados también ofrecen estos servicios, por lo cual debe consultar con su médico.

Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de salud de Oklahoma City-County

(405) 425-4437

revisado en 04/2013

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play

