



Escherichia coli O157:H7 Hoja de Datos

¿Qué es E. coli O157:H7?

E. coli O157:H7 es una bacteria que causa diarrea con sangre. Usualmente ocurre en el verano. El término E. coli O157:H7 indica un tipo de bacteria E. coli en particular.

¿Quién puede ser infectado?

Cualquier persona puede ser infectada con E. coli O157:H7.

¿Cómo se propagan las bacterias?

Las bacterias son propagadas comiendo o bebiendo comida o agua que ha sido contaminada por las heces fecales (excremento) de personas o animales infectados. Carne mal cocida, especialmente carne molida, o leche cruda también puede contener las bacterias. Lavarse las manos después de usar el inodoro y antes de preparar los alimentos es la mejor manera de impedir la propagación de las bacterias.

¿Cuáles son los síntomas de la infección de E. coli O157:H7?

El mayor síntoma es diarrea, que puede dar la apariencia de agua sangrienta. Dolores de estómago y escalofríos pueden ocurrir, pero usualmente no se presenta fiebre alguna.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





Escherichia coli O157:H7 Hoja de Datos

¿Qué tan pronto se presentan los síntomas después de la infección?

Los síntomas usualmente comienzan de 2 a 6 d días después de la infección.

¿Puede causar problemas severos la infección E. coli O157:H7?

Raramente, la infección puede causar que los riñones dejen de funcionar, especialmente en niños pequeños.

¿Dónde se encuentran las bacterias E. coli O157:H7?

Las bacterias E. coli O157:H7 se encuentran en humanos y vacas. Los animales infectados pueden contaminar los productos cárnicos, suministros de agua, leche y otros artículos alimenticios.

¿Por cuanto tiempo puede una persona infectada propagar el E. coli O157:H7?

Una persona infectada con diarrea puede propagar la bacteria a otros por tanto tiempo como dure la diarrea.

¿Deberían las personas infectadas ser excluidas de la escuela o el trabajo?

Como las bacterias son propagadas por las heces fecales, personas con diarrea (especialmente niños en guarderías, trabajadores de salud, o personas que manipulan alimentos) no deberían asistir a la escuela o el trabajo.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





Escherichia coli O157:H7 Hoja de Datos

Después que pase la diarrea, las personas pueden regresar a la escuela o el trabajo, pero tendrían que lavarse las manos cuidadosamente después de usar el inodoro.

¿Cuál es el tratamiento para la infección E. coli O157:H7?

La mayoría de las personas se mejoran por sí solas. Las personas con diarrea deben de tomar líquidos abundantes. Antibióticos pueden ser usados para tratar casos severos.

Para mayor información, contacte al Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City

(405) 425-4437

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





OCCHD.ORG |  **Facebook** - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o [Google Play](#)

