



HOJA DE INFORMACION SOBRE LA VARICELA

¿Qué es la Varicela?

La Varicela es una enfermedad contagiosa causada por un virus.

¿Cómo puede reconocerse?

Las 4 etapas de la erupción son: 1) una pápula roja (protuberancia o bulto); 2) una vesícula (ampolla clara,) aparece encima de la pápula; 3) la vesícula llega a ser una pústula (su contenido se hace gris); 4) la pústula se seca y se hace una costra.

Podría haber únicamente algunas manchas, o haber cientos. Aparecen en brotes, en un período de 4 días. Varias etapas podrían presentarse al mismo tiempo (el niño puede tener pápulas, ampollas, pústulas y costras al mismo tiempo.) Podría dejar cicatrices permanentes, especialmente si las ampollas se infectan por una bacteria. Podría no tener fiebre o tener una fiebre muy alta y podría aparecer algunos días antes de la erupción.

¿Cuánto tiempo se lleva desde la exposición hasta el desarrollo de la enfermedad?

El período de incubación es de 2 a 3 semanas.

¿Cuándo es contagioso?

Desde cinco días antes de que la erupción aparece hasta seis (6) días después de la aparición del primer brote de ampollas o hasta que todas las manchas se hayan secado y encostrado cualquiera que sea lo que tarde más.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





HOJA DE INFORMACION SOBRE LA VARICELA

¿Cómo se disemina?

A través de gotitas de la nariz, de la boca, de la garganta, usualmente expulsadas al toser o estornudar. También puede diseminarse por contacto directo, como comer, tomar, compartir objetos personales o por el líquido o fluido de las vesículas o ampollas de un niño infectado (contacto diseminado respiratorio y directo) Las costras NO son contagiosas.

¿Qué se puede hacer?

- Aislar al niño de otros niños.
- Notificar a los padres que recojan al niño.
- Lavar artículos sucios por secreciones nasales, de la garganta y ampollas.

¿Quién debe de ser notificado?

- Notifique a otros padres después de que el caso haya sido confirmado.
- Observe de cerca a otros niños por síntomas tempranos hasta por 3 semanas.

¿Cuándo el niño puede ser readmitido al centro?

Seis días después de la aparición del primer brote de ampollas o cuando todas las ampollas se hayan hecho costra y se hayan secado.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





¿Qué se puede hacer para prevenir la diseminación de la varicela?

Cualquier persona tosiendo o estornudando debería de cubrirse la nariz y la boca. No coma o tome después de otros. Lavarse las manos cuidadosamente puede prevenir la diseminación. Hay una vacuna disponible para protección contra la varicela; compruébelo con su proveedor médico o su departamento de salud local.

*Para más información contacte al
Departamento de Salud de la Ciudad y
del Condado de Oklahoma*

(405) 425-4437

Revisado 10/05/16

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





OCCHD.ORG |  **Facebook** - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o [Google Play](#)

