



## Hoja de Información sobre Doxiciclina

### ¿Qué es la Doxiciclina?

La Doxiciclina pertenece a una clase de antibióticos llamados Tetraciclinas. Ha sido aprobado por la Administración de comida y drogas, por sus siglas en inglés (FDA) para tratar y proteger a las personas que han sido expuestas a las esporas del Anthrax. La Doxiciclina se prescribe en tabletas orales de 100 mg o en suspensión oral para niños.

### ¿Cómo tomar la doxiciclina?

**Adultos:** Tome 1 tableta cada 12 horas como se le indica

**Niños:** La dosis de un niño depende de su peso corporal. Déle el medicamento cómo se indica en el documento adicional de dosificación.

Tome la doxiciclina con comida y por lo menos con un vaso lleno de agua. Evite tomar antiácidos (como Tums o Maalox), cholestyramine (Questran), colestipol (Colestid), productos lácteos (cómo leche o yogurt) o vitaminas 3 horas antes o después de tomar doxiciclina.

### Dosis de doxiciclina en un ataque de Plaga:

Un tratamiento de 7 días será proporcionado a todos los individuos que pudieran haber sido expuestos a la plaga.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





## Hoja de Información sobre Doxiciclina

### ¿Qué hacer si se le olvida tomar una dosis?

Si se le olvida una dosis, principie tomando una tableta cada 12 horas. No tome 2 pastillas para reponer la que se le olvidó. Termine todas las pastillas, aunque ya se sienta bien a menos que su doctor le diga que deje de tomarlas. Si deja de tomar la medicina muy pronto podría llegar a enfermarse.

### Efectos secundarios de la doxiciclina

Los efectos secundarios de la doxiciclina incluyen: molestias estomacales, vómitos o diarrea. Si tiene problemas con alguno de estos síntomas, dígaselo a su doctor. Efectos secundarios menos comunes incluyen orina oscura, ojos o piel amarillenta, dolor de garganta, sangrado no usual y moretes, fatiga, parches blanquesinos en la boca. Si alguno de estos síntomas aparecen llame a su doctor inmediatamente. **Reacciones alérgicas son muy raras.** Signos de reacción alérgica incluyen: Erupción cutánea (ronchas) comezón, edema o hinchazón de la lengua, manos o pies, fiebre o dificultad para respirar.

**Nota especial para niños:** Esta medicina puede manchar los dientes en niños menores de 8 años. Esto significa que los dientes pueden llegar a ser de color grisoso y éste color no desaparece. Esta medicina también puede causar retraso en el crecimiento óseo(huesos) de niños

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





## Hoja de Información sobre Doxiciclina

prematurados pero este efecto secundario desaparece después de terminar la medicina.

**Nota Especial para mujeres embarazadas:** Hay pocos datos acerca de los efectos secundarios por el uso de esta droga durante el embarazo. Si la madre de un niño que aún no ha nacido toma doxiciclina, manchas en los dientes y/o desarrollo pobre de los huesos puede ser el resultado. Hay un riesgo muy remoto de daño severo del hígado en algunas mujeres embarazadas.

### Precauciones:

- Asegúrese de decirle a su doctor si es alérgico a algún medicamento.
- Es muy importante decirle a su doctor acerca de TODAS las medicinas que actualmente está tomando incluyendo medicinas que fueron compradas en la tienda como vitaminas y antiácidos.
- La doxiciclina puede hacer la piel muy sensible al sol lo que aumenta el riesgo de quemaduras. Evite el sol lo más que pueda. Cuando esté afuera use camisas de manga larga y sombrero y siempre aplíquese loción con protector solar (30 SPF).
- Las pastillas anticonceptivas puede ser que no funcionen tan bien cuando está tomando este medicamento. Asegúrese de usar condones u otra

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





## Hoja de Información sobre Doxiciclina

forma de anticonceptivo hasta que haya terminado completamente el tratamiento. Si está embarazada o dando lactancia materna, dígaselo a su doctor.

- En mujeres, la doxiciclina puede causar comezón vaginal y flujo conocido como infección de hongos. Dígaselo a su doctor si esto ocurre.
- Dígale a su doctor si usted tiene problemas con su hígado o riñones, o si usted tiene frecuentemente agruras.

*Para mayor información comuníquese al Departamento de Salud de la Ciudad y del Condado de Oklahoma al*

(405) 425-4437

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play

