



Hoja de Información sobre Ehrlichiosis

¿Qué es la enfermedad ehrlichiosis?

Ehrlichiosis es una enfermedad infecciosa recientemente reconocida la cual afecta a las personas y a los animales y es causada por un microorganismo bacteriano llamado Ehrlichia. En los Estados Unidos la ehrlichiosis es principalmente encontrada en las regiones del sureste, sur y centro del país. Actualmente se sabe que en los Estados Unidos hay dos formas diferentes de ehrlichiosis humana, dependiendo de la clase de glóbulos blancos que han sido infectados. La ehrlichiosis monocítica humana (HME) es causada por *E. chaffeensis* y la Ehrlichiosis granulocítica humana (HGE) es causada por una especie diferente de Ehrlichia no nombrada aún.

La Ehrlichiosis Canina y “Potomac horse fever” (Fiebre del caballo del Potomac) son las enfermedades de animales más comunes causadas por agentes de Ehrlichia pero no se ha pensado que esta Ehrlichia cause enfermedad en los humanos.

¿Cómo se disemina la ehrlichiosis?

La Ehrlichiosis se adquiere por la mordedura de una garrapata infectada. Los vectores principales de una garrapata infectada son el *Amblyomma americanum* (“lone star tick”) y el *Ixodes scapularis* (“black legged deer tick”). La Ehrlichiosis no puede ser diseminada de persona a persona o por contacto directo con un animal infectado.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





Hoja de Información sobre Ehrlichiosis

¿A quién le da ehrlichiosis?

Todas las personas son susceptibles a ehrlichiosis, pero las personas que pasan mucho tiempo afuera están más expuestas a infectarse con garrapatas. La mayoría de casos de ehrlichiosis ocurre entre los meses de Mayo y Septiembre.

¿Cuáles son los síntomas de la ehrlichiosis?

Los síntomas tempranos son como de “gripe” en naturaleza. Pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, pérdida de apetito, náusea, vómito y dolor muscular. Algunas personas (un 20%) tendrán una erupción de la piel o ronchas junto con los síntomas de “gripe”. Los adultos con severa infección pueden desarrollar tos, diarrea, ganglios linfáticos aumentados de tamaño, anemia, disminución de plaquetas (trombocitopenia) y disminución de glóbulos blancos (leucopenia).

¿Qué tan pronto aparecen los síntomas?

Los síntomas parecidos a los de la “gripe” y posiblemente la erupción o ronchas ocurre más o menos de 7-21 días después de una picadura de garrapata.

¿Cuál es el tratamiento para ehrlichiosis?

El antibiótico de elección para el tratamiento es tetraciclina o doxiciclina.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

[OCCHD App](#) - Busque OCCHD en la Apple Store



o [Google Play](#)





Hoja de Información sobre Ehrlichiosis

¿Cómo se puede prevenir la ehrlichiosis?

Los métodos convencionales para evitar la exposición a las garrapatas y su adhesión son las únicas formas de protegerse asimismo contra la ehrlichiosis. Si va a estar trabajando en áreas de grama o con madera donde las garrapatas están presentes, debe de usar ropa de colores claros para visualizar las garrapatas más pronto. Preferiblemente, una camisa de manga larga con pantalones largos metidos entre los calcetines o botas deben de ser usados. Repelentes para garrapatas DEET pueden aplicarse sobre la piel (con uso limitado en infantes y niños pequeños) y el permetrin puede ser aplicado a la ropa. Siempre efectúe “inspecciones frecuentes” de garrapatas y elimine alguna garrapata adherida tan pronto como sea posible. Si ocurre una picadura de garrapata, anote la fecha y comuníquese con su médico particular si la persona llegara a enfermarse.

Para más información, comuníquese al Departamento de Salud de la Ciudad y del Condado de Oklahoma

(405) 425-4437

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play

